

CARTE DE LA VEGETATION POTENTIELLE  
DE LA FRANCE

par P. OZENDA et M.J. LUCAS

UNIVERSITE DE GRENOBLE  
ET CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
LABORATOIRE D'ECOLOGIE ET BIOGEOGRAPHIE  
DES GRANDS SYSTEMES MONTAGNEUX (UA 242)  
1986

Extrait de "Documents de Cartographie Ecologique" 1986



A - VEGETATION MEDITERRANEENNE

- 1 Etage thermoméditerranéen (Alpes maritimes) et stations isolées (Provence et Corse)
- 2a Etage mésoméditerranéen inférieur à Chêne-liège
- 2b Etage mésoméditerranéen inférieur à Chêne vert (et à Pin d'Alep en Provence)
- 3 Etage mésoméditerranéen supérieur
- 4 Etage supraméditerranéen calcicole: a, type provençal, niveau inférieur b, id., niveau normal et subméditerranéen du couloir rhodanien; c, type préligure: d, type languedocien; e, type subméditerranéen de Limagne
- 5 Etage supraméditerranéen silicicole, avec Châtaignier (Cévennes, Pyrénées orientales, Corse)
- 6 Etage montagnard corse
- 7 Etage altiméditerranéen corse

B - VEGETATION ATLANTIQUE

- 11 Chênaies oligotrophes sur sables (11a à 11d, voir texte)
- 12 Chênaies acidophiles sur sols lessivés:
  - 12a1 et 12a2 type béarnais à *Quercus pyrenaica*; 12a3 id. avec Hêtre
  - 12b Bassin Parisien
  - 12c type sur sol profond, à *Quercus robur* dominant (Vendée et Sud-Bretagne)
  - 12d type limousin avec Châtaignier
- 13 Chênaies mixtes à *Quercus robur*, *Quercus petraea* et *Quercus pubescens*
- 14 Chênaies-Frênaies à *Endymion*
- 15 Chênaies calcicoles à *Quercus pubescens* (Causses occidentaux)
- 16 Chênaies-Hêtraies armoricaines
  - a, b, c, d, type à *Ruscus* b, faciès submontagnard avec tourbières;
  - c, type à *Ilex*; d, faciès à Sapin
- 17 Zone littorale à Orme
- 18 Chênaies-Hêtraies submontagnardes du Massif Central
- 19 Chênaies-Hêtraies normando-picardes

C - VEGETATION SUBCONTINENTALE

- 21 Chênaies à Charme sur sols drainés
- 22 Chênaies à Charme sur sols profonds, à *Quercus robur* dominant
- 22b Zones marécageuses à étangs
- 23 Chênaies pubescentes avec Charme; 23a type delphino-jurassien; 23b, types septentrionaux (Côte d'Or, Alsace, Champagne)
- 24 Chênaies-Hêtraies subatlantiques à Luzule
- 25 Pinèdes-Hêtraies et Hêtraies de type lorrain
- 26 Pinèdes subcontinentales (Moselle)

D - VEGETATION DE MOYENNE MONTAGNE

- D1 - HÊTRAIES ET HÊTRAIES-SAPINIÈRES
- 31 Hêtraies atlantiques (Pyrénées, Massif Central); 31a type pyrénéo-cantabrique (sans Sapin)
  - 32 Hêtraies subatlantiques silicicoles (Massif Central oriental, Vosges)
  - 33 Hêtraies calcicoles des Préalpes et du Jura
  - 34 Hêtraies subméditerranéennes

D2 - MONTAGNARD CONTINENTAL

- 36 Sapinières et Pessières internes
- 37 Pinèdes sylvestres mésophiles
  - faciès à Sapin
  - 37a Pinèdes mixtes
- 38 Pinèdes xérophiles intraalpines

E - VEGETATION DE HAUTE MONTAGNE

- 41 Subalpin externe à Epicéa et Pin à crochets
- 42 Subalpin intra-alpin à Mélèze et Pin cembro
- 43 Subalpin pyrénéen à Pin à crochets
- 44 Subalpin asylvatique du Massif Central et des Vosges
- 45 Etage alpin
- 46 Etage nival

F - VEGETATIONS AZONALES

- 51 Formations halophiles littorales
  - 51a Zosteres (Languedoc)
  - 51b Zone semi-halophytique à rizières (Camargue)
- 52 Polders
- 53 Marais littoraux et sublittoraux
- 54 Plaines alluviales
- 55 Dunes

Cette carte n'est pas destinée à être utilisée séparément, mais à représenter la répartition générale des unités de végétation dont la définition, la composition et les subdivisions sont discutées dans la notice.

En raison de la différence de densité et de précision de la documentation disponible, la moitié nord n'a pu être aussi détaillée que la moitié sud.

0 10 60km  
ECHELLE 1/1 500 000  
© Laboratoire de Biologie Végétale, Grenoble, France